

Tiolene

- › FUNGICIDA A BASE DI ZOLFO IN FORMULAZIONE FLOWABLE
- › PARTICELLE FINEMENTE MICRONIZZATE E DISPERSE IN ACQUA
- › OTTIMA ED UNIFORME COPERTURA DELLA VEGETAZIONE TRATTATA
- › ATTIVO VERSO TUTTE LE FORME DI OIDIO CON MECCANISMO ASPECIFICO
- › ELEVATA ADESIVITÀ, RESISTENZA AL DILAVAMENTO E PERSISTENZA



COMPOSIZIONE
zolfo (esente da selenio)
56,09% (800 g/l)

FORMULAZIONE
sospensione concentrata (SC)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: EUH208; EUH210; EUH401

CODICE FRAC
M02

BUFFER ZONE
Non previste

REG. MIN. SALUTE
n° 7764 del 28.04.1989

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Vite	Oidio	3-4 l/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, intervenendo ogni 7 gg (intervallo minimo)	5 gg	8
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Eriofidi				
Drupacee	Oidio, Bolla				
Nocciolo	Oidio, Eriofidi				
Pomodoro e altri ortaggi a frutto (Solanacee, Cucurbitacee) in campo e serra	Oidio	2 l/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, intervenendo ogni 10 gg (intervallo minimo)	3 gg	6
Cavoli, Ortaggi a stelo in campo					
Legumi freschi e da granella in campo					
Floreali ed Ornamentali in pieno campo e serra, Forestali	Oidio	3 l/ha		n.r.	5
Cereali	Oidio	8-10 l/ha		5 gg	4

Prodotto originale **IACHEM**

FLACONE
1 litro
(cartone 10 pz)

TANICA
5 litri
(cartone 4 pz)

TANICA
10 litri

*nuova
taglia*



AVVERTENZE

Non compatibile con oli minerali e captano; se si usa un olio minerale estivo è possibile distanziare i trattamenti come specificato nel paragrafo "avvertenze" di Agrumin. Può risultare fitotossico su alcune cultivar di Melo, Pero e Cucurbitacee (vedi etichetta). Nei trattamenti su cucurbitacee, colture floricole ed ornamentali si consigliano saggi preliminari. In serra e con elevate temperature impiegare dosi ridotte.