


- PENTACALCIUM -

Ca/Mg + ALA - ACIDO 5 AMINOLEVULINICO



MAGGIORE CONSERVABILITÀ DEI FRUTTI
MAGGIORE PRODUZIONE E UNIFORMITÀ DI PEZZATURA
RAPIDO RINVERDIMENTO PER EFFETTO DI UNA MAGGIORE
ATTIVITÀ FOTOSINTETICA



WWW.DIACHEMITALIA.IT

Diagro® marchio di Diachem S.p.A.

LAMELA
NONSI
TOCCA

Guarda il film su
www.lamelanonsitocca.it

 **DIAGRO®**

PENTACALCIUM. ACCELERATORE DI FOTOSINTESI CON ACIDO 5-AMINOLEVULINICO

APPORTO DI CALCIO E MAGNESIO ad elevata efficienza di assorbimento.

LA PRESENZA DI ALA PERMETTE ALLE PIANTE TRATTATE UN RAPIDO RINVERDIMENTO per effetto di una maggiore attività fotosintetica e per un più elevato assorbimento radicale di acqua e nutrienti, fra cui ferro e manganese.

SI IMPIEGA PER VIA FOGLIARE NELLA PREVENZIONE DELLE PIÙ COMUNI FISIOPATIE DA CALCIO-CARENZA di pomacee, drupacee, kiwi, vite e uva da tavola, fragola, pomodoro, peperone, melone, lattughe e insalate.

MAGGIORE RESISTENZA alla sovraturazione dei frutti e minore incidenza delle fisiopatie da conservazione (marciumi e riscaldamento).

PRODOTTO ORIGINALE  DIACHEM



COMPOSIZIONE

ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 7,0 %
ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 3,5 %
acido 5-aminolevulinico (ALA) >0,05 %

FORMULAZIONE

liquido solubile

DENSITÀ

1.325 g/l

pH

2,5

COLTURA	DOSE	EPOCA D'INTERVENTO
Pomacee		3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane dalla fase di frutticino (butteratura, cracking, marciumi da conservazione e riscaldamento)
Drupacee		3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane dalla fase di frutticino (cracking, marciumi da conservazione)
Actinidia		2 interventi da allegazione a invaiatura
Vite e Uva da tavola	1,5 l/ha (pari a 1 kg/ha circa)	3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane dalla fase di pre-chiusura grappolo (disseccamento del rachide, marciumi grappolo e resistenza ai trasporti)
Fragola		3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane dalla fase di sviluppo frutticino (prevenzione marciumi e conservabilità a magazzino)
Pomodoro, Peperone, Melone		Interventi ripetuti a intervalli di 1-2 settimane sino a maturazione (marciume apicale e danni da grandine)
Lattughe e Insalate		2-3 interventi ad intervalli di 1-2 settimane da inizio formazione cespo (Tip burn e imbrunimenti fogliari)
Colture floreali e ornamentali	50-80 ml/hl	2-3 interventi ad intervalli di 10-12 gg
Noce	1,5 l/ha	Da allegazione a lignificazione frutto. 2-3 interventi ogni 20 gg

DIAGRO marchio di  DIACHEM S.p.A.

Uffici e stabilimento:

Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG) - Tel. 0363 355611

info@diachemitalia.it www.diachemitalia.it

Azienda con Sistema di Gestione Certificato:

QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001, AMBIENTE ISO 14001

Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

